

# TRICHOFORTE®

Polvo Mojable

## COMPOSICIÓN

Mezcla de cepas de <i>Trichoderma spp</i> *	< 1,0% p/v
Coformulantes c.s.p	100% p/v

\* Contenido mínimo:  $1 \times 10^9$  UFC/gr.  
*Trichoderma atroviride* (Cepas TC, T10)  
*Trichoderma harzianum* (Cepas TF, TA)

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## DESCRIPCIÓN

TRICHOFORTE® es un biocontrolador preventivo en base a *Trichoderma atroviride* y *Trichoderma harzianum*, altamente recomendado para controlar hongos del suelo que afectan a hortalizas y frutales. Las cepas de *Trichoderma spp.* presentes en Trichoforte® WP, se desarrollan en los tejidos superficiales de la raíz generando una Inducción de Resistencia Sistémica (ISR), lo que estimula los propios mecanismos de defensa de las plantas; Además, promueve un crecimiento óptimo del sistema radicular, colonizando exitosamente la rizósfera y compitiendo por espacio y nutrientes con los hongos fitopatógenos presentes en el suelo.

**Contenido neto:**  
0,5 KG

**Fabricado por:**

BIOPACIFIC SPA.  
Santa Elvira 030, Ñuñoa, Santiago, Chile.  
Fono: +56 2 25265228  
[www.biopacific.cl](http://www.biopacific.cl)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



**RED CHILENA  
DE BIOINSUMOS**

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	MODO DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
Tomate	Fusariosis <i>Fusarium oxysporum</i>	0,5 Kg/ha	Vía riego	Aplicación desde el inicio del cultivo caa 20 días hasta inicio de cosecha.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Previo a la aplicación, diluir el producto con agua en un recipiente agitando vigorosamente hasta alcanzar un líquido homogéneo e incorporar en la maquinaria. Realizar la aplicación de preferencia temprano en la mañana o al atardecer.

## COMPATIBILIDAD

TRICHOFORTE® SC presenta una alta compatibilidad con la mayoría de los productos agrícolas del mercado. Para mayor información, consulte la Guía de Compatibilidad o directamente al distribuidor.

## CARENCIA

Al ser un producto biológico, no presenta carencia. Es posible ingresar a la zona inmediatamente realizada la aplicación.

## FITOTOXICIDAD

TRICHOFORTE® SC no presenta fitotoxicidad para ninguno de los cultivos en que ha sido evaluado. Tampoco es riesgoso para abejas, animales y microorganismos presentes de forma natural en el suelo.



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Para su seguridad durante la aplicación:** Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes, botas de goma, delantal y protector facial; aleje animales domésticos y personas ajenas a la aplicación. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento.

**Para su seguridad después de la aplicación:** Lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

**Síntomas de intoxicación:** No hay antecedentes de intoxicación asociados a *Trichoderma spp.*

**Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua limpia.

**Antídoto:** No posee, tratar sintomáticamente.

**Tratamiento médico de emergencia:** Ante cualquier síntoma de molestia, acudir a un centro de salud y atención especializado.

**Ecotoxicidad:** Producto no tóxico para mamíferos, peces, aves, abejas y organismos acuáticos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

**Precauciones de Almacenaje:** El almacenamiento debe ser en un lugar fresco, seco y la sombra; separado de semillas, forrajes y fertilizantes; siempre conservando el producto en su envase original, bien cerrado. No debe exponerse al sol ni a las altas temperaturas. Evitar contacto con bases fuertes, ácidos y agentes oxidantes.

**Instrucciones para el Triple Lavado:** Lavar el envase con agua limpia al menos tres veces en forma sucesiva, utilizando no menos un 10% del volumen del contenedor por cada lavado, o bien mediante lavado a presión durante un minuto. El agua resultante incorpórela al estanque de aplicación como parte del agua de preparación. Por último perfore, puncione o aplaste el envase para evitar su reutilización.

**Advertencia:** Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos esta fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

